Recomendaciones de tratamientos para la esclerosis múltiple durante la pandemia de COVID-19

Versión 2.0

Noviembre 2020

1. EVALUAR LOS FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 GRAVE ¹⁻⁷		2. RECOMENACIONES BASADAS EN LA EVIDENCIA ACTUAL				3. CONSENSUAR CON PACIENTE
Edad y factores de riesgo para COVID-19 grave (Tabla 1)	TME	Inicio de tratamiento	Continuar con tratamiento actual	Continuar con tratamiento actual si infección por COVID-19	Recomendaciones ⁸ (Tabla 2)	
< 50 años SIN factores de riesgo	No evidencia de riesgo: IFN, GA, TF, DMF, S1P, NTZ			Posible pero considerar cada caso individualmente	Generales	ACTITUD DEL PACIENTE FRENTE A LA PANDEMIA Y DISCUSIÓN DE RIESGOS/ BENEFICIOS
	No evidencia de riesgo pero datos limitados: ⁶⁻⁷ ALZ, CLA			Retrasar hasta que el paciente esté recuperado	Generales o Estrictas si trabajo de alto riesgo*	
	↑ hospitalización: ³⁻⁴ ANTI-CD20			Retrasar hasta que el paciente esté recuperado	Generales o Estrictas si trabajo de alto riesgo*	
< 50 años CON ≥ 1 factor de riesgo con evidencia heterogénea o sólida ○ ≥ 50 años SIN factores de riesgo con evidencia sólida	No evidencia de riesgo: IFN, GA, TF, DMF, S1P, NTZ			Posible pero considerar cada caso individualmente	Generales	
	No evidencia de riesgo pero datos limitados: ⁶⁻⁷ ALZ, CLA	Posible pero considerar cada caso individualmente	Posible pero considerar cada caso individualmente	Retrasar hasta que el paciente esté recuperado	Generales o Estrictas si trabajo de alto riesgo*	
	↑ hospitalización: ³⁻⁴ ANTI-CD20	Posible pero considerar cada caso individualmente	Posible pero considerar cada caso individualmente	Retrasar hasta que el paciente esté recuperado	Generales o Estrictas si trabajo de alto riesgo*	
≥ 60 años ○ ≥ 50 años CON ≥ 1 factor de riesgo	No evidencia de riesgo: IFN, GA, TF, DMF, S1P, NTZ			Posible pero considerar cada caso individualmente	Generales o Estrictas si trabajo de alto riesgo*	
	No evidencia de riesgo pero datos limitados: ⁶⁻⁷ ALZ, CLA	Considerar otro tratamiento	Considerar retrasar o cambio a otro tratamiento	Retrasar hasta que el paciente esté recuperado	Estrictas	
	↑ hospitalización: ³⁻⁴ ANTI-CD20	Considerar otro tratamiento	Considerar retrasar o cambio a otro tratamiento	Retrasar hasta que el paciente esté recuperado	Estrictas	

Tabla 1. FACTORES DE RIESGO PARA COVID-19 GRAVE¹⁻⁴

COMORBILIDADES¹

EVIDENCIA SÓLIDA	<ul style="list-style-type: none"> • Cardiopatía grave con insuficiencia cardiaca, coronariopatía o miocardiopatía • Cáncer • Insuficiencia renal crónica • Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) • Obesidad (IMC > 30 kg/m²) • Anemia de células falciformes • Trasplante de órganos sólidos • Diabetes mellitus tipo 2 • Tabaquismo • Embarazo
EVIDENCIA HETEROGÉNEA	<ul style="list-style-type: none"> • Asma • Enfermedad cerebrovascular • Hipertensión arterial • Uso crónico de corticoesteroides u otros fármacos inmunosupresores además de TMM

FACTORES RELACIONADOS CON LA ESCLEROSIS MÚLTIPLE²⁻⁴

EVIDENCIA SÓLIDA	<ul style="list-style-type: none"> • EDSS ≥ 6.0 • Formas progresivas
-------------------------	--

Tabla 2. RECOMENDACIONES⁸

RECOMENDACIONES GENERALES

Uso de mascarilla, higiene de manos, mantenimiento de la distancia de seguridad con otras personas, limitar la vida social, tele-trabajar en siempre que sea posible, discutir el riesgo individual de cada paciente para disminuir la exposición al virus y seguir las regulaciones locales.

RECOMENDACIONES ESTRINGIDAS

Aconsejar al paciente sobre el alto riesgo de continuar trabajando si no es posible tele-trabajar

- **Evidencia sólida:** Definida como evidencia concordante entre múltiples estudios pequeños o una asociación de un estudio grande.
- **Evidencia heterogénea:** Definida como aquella en la que múltiples estudios que llegaron a diferentes conclusiones acerca de un factor de riesgo de una enfermedad dada.

Versión 2.0. 12 de noviembre de 2020.

Abreviaturas: TME: Tratamiento Modificadores de la Enfermedad, IFN: Interferon, GA: Acetato de Glatiramero, TFN: Teriflunomida, DMF: Dimetilfumarato, NTZ: Natalizumab, FTY: Fingolimod, CLA: Cladribina, ALZ: Alemtuzumab, Anti-CD20: Terapias anti-CD20 como rituximab o ocrelizumab.

1. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/need-extra-precautions/evidence-table.html>; 2. Louprane C et al. JAMA Neurology, julio 2020; 3. MSIF and MS Data Alliance, septiembre 2020, manuscrito no publicado enviado para publicación; 4. Sormani MP, SSRN Electron J. 2020. doi:10.2139/ssrn.3631244 (pre-print); 6. Zabalza A et al, octubre 2020, manuscrito no publicado enviado para publicación; **6. REGISTRO CLADRIBINA; 7. REGISTRO ALEMTUZUMAB**; 8. Adaptado de Larochelle MR, N Engl J Med, julio 2020

En la actualidad existe evidencia limitada acerca de cómo afecta el COVID-19 a las personas con Esclerosis Múltiple (EM).

El simple hecho de tener EM no parece aumentar el riesgo de presentar COVID-19 o que una vez contraída la infección vaya a tener un curso más grave. Sin embargo, es posible que las personas con formas progresivas de la EM o niveles altos de discapacidad (EDSS >6.0) puedan tener un riesgo sobreañadido de presentar un curso grave del COVID-19 en caso de infectarse.

A pesar de existir una evidencia limitada y requerirse más datos acerca del uso de los fármacos para la EM durante la pandemia por SARS-CoV-2, parece que las personas en tratamiento con interferón, acetato de glatirámero, teriflunomida, dimetilfumarato, natalizumab o fingolimod no tienen un riesgo elevado de presentar síntomas más graves. Las personas que reciben tratamientos anti-CD20 (rituximab u ocrelizumab) podrían presentar una mayor probabilidad de ser hospitalizados por COVID-19. En estos momentos, no parece existir un aumento de la susceptibilidad o de la gravedad en las personas que reciben cladribina o alemtuzumab, aunque hasta el momento no existen suficientes datos para concretar totalmente el riesgo de COVID-19 en estos pacientes.

El riesgo de COVID-19 mencionado tiene que ser individualizado teniendo en cuenta factores independientes de la EM como la edad y las comorbilidades previas